



Přednášky z lékařské biofyziky

Masarykova universita v Brně
Biofyzikální ústav



Biofyzika vnímání světelných podnětů

Obsah přednášky

- Základní vlastnosti světla
- Anatomie oka
- Optické vlastnosti oka
- Sítňice – biologický detektor světla
- Barevné vidění

Základní vlastnosti světla

Viditelné elektromagnetické záření:

$$\lambda = 380 - 760 \text{ nm}$$

Kratší vlnové délky – **Ultrafialové světlo (UV)**

Delší vlnové délky – **Infračervené světlo (IR)**

Viditelné světlo – (VIS)

Prostředí, kterým se světlo šíří, se nazývá **optické prostředí**.

V homogenním prostředí se světlo šíří přímočaře, kolmo k vlnoplochám, čáry směru šíření se označují jako **světelné paprsky**.

Rychlost světla (ve vakuu)

$$c = 299\,792\,458 \text{ m}\cdot\text{s}^{-1} \approx 300\,000\,000 \text{ m}\cdot\text{s}^{-1}$$

Zdroje viditelného (VIS) světla

- **Přirozené**

- **Umělé**

Přirozené: Slunce

Slunce je zdrojem energie pro život a nelze si představit život bez něj.

Umělé: žárovky, fluorescenční zdroje, laser...

Polychromatické a monochromatické světlo, koherence

- **Polychromatické či bílé světlo** je světlem o různých vlnových délkách.
- **Monochromatické světlo** je světlem o jediné vlnové délce.
- Dle svého „fázového“ charakteru může být světlo
 - **Koherentní** - Koherentní světlo jsou světelné vlny jsoucí vzájemně „ve fázi“, tj. mají stejnou fázi v téže vzdálenosti od zdroje. Světlo emitované laserem je koherentní.
 - **Nekoherentní** - Světelné vlny nejsou vzájemně „ve fázi“. Světlo žárovek nebo Slunce je nekoherentní.

Odraz a lom světla

Odraz – zákon odrazu: Úhel odrazu α' je roven úhlu dopadu. Odražený paprsek se šíří v rovině dopadu.

Lom: Když světlo prochází z jednoho prostředí do druhého, jeho svazek mění směr na rozhraní mezi dvěma prostředími. Tato vlastnost optického prostředí je popsána **indexem lomu**

$$n = c/v \text{ [bezrozměrová veličina]}$$

n – index lomu prostředí

c – rychlost světla ve vakuu

v – rychlost světla v prostředí

index lomu vakua je 1

Odraz a lom světla

Snellův zákon (zákon lomu)

$$\frac{\sin \alpha}{\sin \beta} = \frac{n_2}{n_1} = \frac{v_1}{v_2}$$

α – úhel dopadu (v prostředí 1)

β – úhel lomu (v prostředí 2)

(úhly měříme od kolmice!)

n_1, n_2 – indexy lomu

v_1, v_2 – rychlosti světla v daných prostředích

n je velká: velká optická hustota)

n je malá: malá optická hustota

$n_1 > n_2$ – dochází k lomu od kolmice

$n_1 < n_2$ – dochází k lomu ke kolmici

Rovnice „brusičů čoček“

$$\frac{1}{f} = \left(\frac{n_2}{n_1} - 1 \right) \cdot \left(\frac{1}{r_1} + \frac{1}{r_2} \right)$$

f – ohnisková vzdálenost [m]

n_2 – index lomu čočky

n_1 – index lomu okolního prostředí

r_1, r_2 – poloměry křivosti čočky

Obecné principy optického zobrazení

Skutečný obraz (lze promítnout): sbíhavost paprsků

Neskutečný obraz (nelze promítnout): rozbíhavost paprsků

Optická osa – osa centrovaného systému optických rozhraní

Ohnisko - bod, v němž se protínají paprsky dopadající na čočku (zakřivené zrcadlo) rovnoběžně s optickou osou. Rozlišujeme přední (předmětové) ohnisko a zadní (obrazové) ohnisko

Ohnisková vzdálenost f [m] je vzdálenost ohniska od středu čočky nebo zrcadla

Poloměry křivosti jsou kladné (záporné), pokud je příslušná čočka nebo povrch zrcadla konvexní (konkávní).

Optická mohutnost (síla čočky): převrácená hodnota ohniskové vzdálenosti

$$\phi = D = S = 1/f \quad [\text{m}^{-1} = \text{dpt} = D \text{ (dioptrie)}]$$

Spojné čočky: f a ϕ jsou kladné

Rozptylné čočky: f a ϕ jsou záporné

Rovnice čočky

- Paprsky rovnoběžné s optickou osou se lámou do obrazového ohniska (u spojně čočky), nebo tak, že se zdají vycházet z předmětového ohniska (u rozptylky). Směr paprsků procházejících středem čočky se nemění.
Rovnice čočky:

a – vzdálenost předmětu [m]

b – vzdálenost obrazu [m]

Znaménková konvence:


a je kladné před čočkou, záporné za čočkou;

b je záporné před čočkou (obraz je neskutečný), kladné za čočkou (obraz je skutečný)

$$\frac{1}{f} = \frac{1}{a} + \frac{1}{b}$$

Viditelné spektrum

Lidské oko je citlivé na světlo od vlnové délky zhruba 380 nm (fialové) do asi 760 nm (červené). Náš zrakový analyzátor vnímá tento rozsah vlnových délek jako spojitě duhové spektrum. Nazýváme je **viditelné spektrum**. Viz obrázek.




Anatomie oka

Jak pracuje lidské oko?


Jednotlivé části oka pracují podobným způsobem jako části (digitálního) fotografického přístroje.

Každá část je důležitá pro zřetelné vidění.



<https://kids.britannica.com/kids/assembly/view/87818>

Fot. přístroj




Lidské oko

Zrakový analyzátor má 3 části:

- **oko** - z biofyzikálního hlediska nejlépe prozkoumaná část, v níž optickou a fotochemickou cestou vzniká primární obraz vnějšího světa
- **optické dráhy** - systém nervových buněk, tvořících kanál, jímž se informace zachycená a zpracovaná okem dostává do mozku
- **zrkové centrum** - oblast mozkové kůry, v níž si obraz vnějšího světa uvědomujeme

Anatomie oka



Anatomie oka

Tuhá nejzevnější vrstva oka se nazývá **bělima**, udržuje tvar oka.

Přední asi šestina této vrstvy se nazývá **rohovka**. Veškeré světlo musí po vstupu do oka nejdříve projít přes rohovku. K bělimě je připojeno 6 **okohybných svalů**.

Cévnatka (hlavní část živnatky) je druhou vrstvou oka. Obsahuje cévy, které zásobují krví struktury oka. Přední část cévnatky přechází do dvou struktur:

- **Řasnaté těleso** – obsahuje svaly a je spojeno s čočkou. Kontrakce a relaxace těchto svalů způsobují změny zakřivení čočky při zaostřování (akomodaci).

Anatomie oka

■ **Duhovka** (*iris*) – barevná část oka. Barva duhovky je dána barvou vazivové tkáně a pigmentovými buňkami. Méně pigmentu způsobuje, že oči jsou modré, více pigmentu způsobuje hnědé zbarvení. Duhovka je přizpůsobivá blána s otvorem uprostřed, nazývajícím se **zornice** (*pupilla*).

Uvnitř oka se nacházejí dva kapalinou vyplněné oddíly oddělené čočkou. Větší zadní oddíl obsahuje čirou gelovitou látku zvanou **sklivec** (*corpus vitreum*).

Menší přední oddíl obsahuje čirou vodnatou tekutinu zvanou **komorová voda**.

Tato část oka je rozdělena na dva oddíly zvané přední a zadní komora (před duhovkou a za duhovkou). Komorová voda je produkována řasnatým tělesem.

Anatomie oka

Duhovka má dva svaly:

M. dilator pupillae zmenšuje duhovku a tím zvětšuje zornici a množství světla vstupujícího do oka;

M. sphincter pupillae duhovku zvětšuje a zmenšuje zornici stejně jako množství světla vstupujícího do oka.

Průměr zornice se mění od 2 do 8 mm.

To znamená, že množství světla vstupujícího do oka se může změnit 30-násobně.

Anatomie oka

Průhledná **čočka** (*lens crystallina*) je umístěna těsně za duhovkou. Je to čirá dvojvypuklá struktura s průměrem přibližně 10 mm. Je udržována v oploštěném stavu tahem vláken závěsného aparátu. Čočka může měnit svůj tvar, protože je připojena ke svalům řasnatého tělesa, které působí proti tahu závěsných vláken. Jestliže jsou ciliární svaly

- **relaxované, zakřivení čočky se zmenšuje**, dochází k oploštění čočky;

- **kontrahované, zakřivení čočky se zvětšuje**, čočka je vypuklejší (což je její přirozený stav).

Tyto změny umožňují oku přizpůsobit optický systém oka pro pozorování vzdálených i blízkých předmětů.

Čočka je složena ze 4 vrstev, ve směru od povrchu ke středu to jsou: kapsula, subkapsulární epitel, kůra a jádro.

Nitrooční tlak

(dynamická rovnováha mezi tvorbou a odtokem komorové vody)

2,66 kPa (20 mmHg) $\pm$ 0,3 kPa

Odchyvky větší než 0,3 kPa jsou známkou vážnější oční poruchy.


Optické vlastnosti oka

Model *Gullstrandův*

*(Alvar Gullstrand 1852 - 1930, švédský oftalmolog,
Nobelova cena za medicínu v r. 1911)*

Vychází z představy oka jako centrované optické soustavy se schopností automatického zaostřování, nebere však ohled na určité rozdíly v zakřivení přední a zadní plochy rohovky ani na rozdíly v indexu lomu jádra a okraje čočky.

Základní parametry Gullstrandova modelu oka



Allvar Gullstrand

1852 – 1930

Nobelova cena - 1911

■ Indexy lomu:

rohovka.....	1,376
komorová voda.....	1,336
čočka	1,413
sklivec.....	1,336

■ Optické mohutnosti:

rohovka	42,7 D
čočka uvnitř oka	21,7 D
oko jako celek	60,5 D

■ Poloměr křivosti:

rohovka	7,8 mm
přední plocha čočky	10,0 mm
zadní plocha čočky	-6,0 mm

■ Poloha ohnisek

(měří se od vrcholu rohovky):

ohnisko předmětové	-14,99 mm
ohnisko obrazové	23,90 mm
poloha sítnice	23,90 mm

Akomodace


Schopnost oční čočky měnit svoji optickou mohutnost v závislosti na vzdálenosti pozorovaného objektu.

(**zvětšením** zakřivení přední plochy čočky)

J. E Purkyně

Bod daleký - *punctum remotum* (R)

Bod blízký - *punctum proximum* (P)




Akomodační šíře, presbyopie

Rozdíl *reciprokých hodnot vzdáleností* obou bodů od oka, vyjádřený v dioptriích (rozdíl tzv. vergencí těchto bodů)


U emetropického oka je vergence vzdáleného bodu nulová ($1/\infty = 0$), akomodační šíře je dána vergencí blízkého bodu.

Presbyopie (starozrakost, vetchozrakost)

Jedinec již není schopen vidět ostře předměty v konvenční vzdálenosti 0,25 m nebo bližší. Je způsobena zmenšením pružnosti čočky a ochabováním ciliárních svalů po překročení 40 let.



Úbytek akomodační schopnosti s věkem




Sítnice – biologický detektor světla

Sítnice – část oka citlivá na světlo. Obsahuje **tyčinky** odpovědné za vidění při slabém osvětlení a **čípky** zodpovědné za vidění barev a detailů. Jakmile na tyto dva typy buněk dopadne světlo, dojde k sérii složitých biochemických reakcí. Světlem aktivovaný rodopsin začne vytvářet elektrické impulsy, které jsou dále vedeny optickým nervem. Platí, že vnější segment tyčinek je dlouhý a tenký, zatímco vnější segmenty čípků mají spíše kuželovitý tvar.

V centrální části sítnice se nachází **macula lutea (žlutá skvrna)**. Uprostřed makuly se nachází oblast zvaná **fovea centralis**. Zde se nacházejí pouze čípky a jejich vysoká hustota umožňuje rozlišování detailů.

Slepá a žlutá skvrna


Od žluté skvrny k periférii čípků ubývá. Maximální hustota tyčinek je v kruhu asi 20° od žluté skvrny (úhel je měřen od zadního vrcholu čočky). Nervová vlákna vedoucí podráždění z fotoreceptorů se sbíhají nazálně od žluté skvrny, kde tvoří papilu zrkového nervu. Toto místo neobsahuje žádné fotoreceptory a nazývá se **slepá skvrna**.



Tyčinky a čípky

Vnější segment tyčinky nebo čípku obsahuje fotosenzitivní látky. V tyčinkách je touto látkou **rodopsin**. Analogické látky v čípcích jsou označovány jako **barevné pigmenty** nebo **jodopsin**.



Sítnice obsahuje asi 100 milionů tyčinek a asi 7 milionů čípků.




Rodopsin

Jakmile světlo dopadne na fotosensitivní molekulu **rodopsinu**, nastane fotochemická reakce. Rodopsin je komplex tvořený bílkovinou zvanou **scot(opsin)** a **11-cis-retinalem**, jehož prekursorem je **vitamin A** ($\Rightarrow$ nedostatek vitaminu A způsobuje problémy s viděním). Jestliže je rodopsin vystaven světlu, dochází k jeho rozpadu, a to v důsledku změny 11-cis-retinalu na **all-trans-retinal**. K této reakci dojde během několika *triliontin* sekundy (10^{-18}). 11-cis-retinal je „zprohýbaný“, zatímco all-trans-retinal má přímou molekulu, což jej činí chemicky nestabilním. Za vznik elektrického podráždění odpovídá **metarhodopsin II** (aktivovaný rodopsin). Následuje schéma celého procesu včetně obnovy rodopsinu.

Biochemie rodopsinu:












Struktura sítnice



Zrakové klamy

ukazují na úlohu zrakové části mozkové kůry při zpracování zrakové informace





Elektrické projevy sítnice

Elektrická aktivita sítnice je v úzkém vztahu k fotochemickým reakcím, probíhajícím ve fotoreceptorech při dopadu světla.

- **raný receptorový potenciál**
- **pozdní receptorový potenciál**

Elektroretinografie (ERG), snímání pomocí dvou unipolárních svodů,

100 - 400 μV


Barevné vidění

Barevné vidění

Barvy dělíme:

- **základní**
- **doplňkové**, tj takové, které vzájemným smísením dají počitek neutrální šedé a bílé barvy. Každá vnímaná barva je charakterizována barevným tónem, světlostí a sytostí.


barevný tón je určen vlnovou délkou světla,
světlost intenzitou (jasem) světla
syťost barevností počitku.



J. E. Purkyně

změna poměrné světelnosti
barev při adaptaci oka na
tmu – PURKYŇŮV JEV

Barevný trojúhelník CIE



**x – červená b.
650 nm,**


**y – zelená b.
530 nm**

**z – modrá b.
460 nm**


$$x + y + z = 1$$

Barevné vidění – spektrální citlivost



Čípky citlivé na červenou barvu




Čípky citlivé na modrou barvu




Čípky citlivé na zelenou barvu



Citlivost oka na vlnovou délku



Čípky „sumárně“



Barvocit

Schopnost správného vnímání barev lidským okem


Mechanismus vnímání barev není sice ještě jednoznačně rozřešen, všeobecně je však přijímána tzv. **trichromatická teorie**, spojená se jmény Helmholtze, Lomonosova a Younga. Jednotliví autoři se liší jen v charakteristice tří základních barev. *Helmholtz* za ně považoval červenou, zelenou a fialovou, *Lomonosov* a *Young* červenou, žlutou a modrou.

- Monochromáti - vnější svět vnímají pouze v odstínech šedi
- Dichromáti – částečná ztráta barvocitu, v sítnici chybí mechanismus pro vnímání jedné ze základních tří barev
- Trichromáti – jedinci s normálním barvocitem


Vyšetřování barvocitu

Pseudoizochromatické tabulky

různých autorů (Stillingovy, Velhagenovy, Ischiharovy, Rabkinovy). Číslice nebo písmena jsou sestavena z okrouhlých barevných políček v záměnné barvě. Dichromát daného typu písmeno či číslici nerozezná.



Vyšetření anomaloskopické. Nagelův anomaloskop je modifikovaný spektrální fotometr, pomocí něhož se barvocit určuje ze vztahu vyšetřovaného k vidění červené a zelené barvy.



Meze lidského zraku:

zraková ostrost - testuje se pomocí

Snellenových optotypů (viz praktika) - dána úhlem jedné obloukové minuty

- limit citlivosti: 2-3 fotony během několika milisekund
- kritická frekvence splývání světelných impulsů: 5 - 60 Hz v závislosti na jasu
- omezení vlnovými délkami světla: 380 - 760 nm
- mez stereoskopického vidění: rozdíl stereoskopické paralaxy menší než dvacet úhlových vteřin

Autoři
Vojtěch Mornstein, Lenka Forýtková

Obsahová spolupráce:
Ivo Hrazdira, Carmel J. Caruana

Grafika:

-

Poslední revize: listopad 2018